

CONSIDERACIONES NOMENCLATURALES SOBRE DOS LAGARTIJAS ARGENTINAS

R. Donoso-Barros

Instituto Central de Biología

Durante una revisión de iguanidos neotropicales he podido comprobar la existencia de numerosos problemas taxonómicos que reclaman aclaraciones, por lo cual serán sucesivamente comunicados. La presente relación se refiere a dos especies que han sido adscritas al género **Liolaemus**.

Este género tiene abundante representación en Argentina, sin embargo su conocimiento dista de ser completo, lo que fácilmente se supone en un país de la magnitud y variedad de ambientes de esta nación.

Los iguanidos argentinos y especialmente los del género **Liolaemus** fueron objeto de varios trabajos que se inician en el primer cuarto del siglo diecinueve con las comunicaciones de Thomas Bell y A. M. C. Dumeril y G. Bibron. La segunda mitad del siglo diecinueve recibió aportes de George A. Boulenger y en especial de Julio Koslowsky, un joven herpetólogo argentino, que a pesar de sus brillantes condiciones, trabajó sólo breve tiempo sobre herpetozoos.

Durante la primera mitad del siglo veinte existen importantes contribuciones debidas a la pluma de Lorenz Müller y de Walter Hellmich. A partir de la segunda de la presente centuria pueden considerarse varios aportes hechos por investigadores latinoamericanos como Marcos Freiberg y José M. Gallardo.

El género **Liolaemus** es un género muy extenso, con diferentes tipos de adaptaciones extendidas en un inmenso territorio que incluye Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Este género tiene relaciones muy cercanas con **Stenocercus**, **Proctotretus** y demasiado mediatas con **Ctenoblepharys** y **Phrynosaura**. Por ello es frecuente encontrar algunas confusiones genéricas cuando no se tienen muy presentes estas afinidades. Es en relación con esto último que queremos fijar los taxones de dos especies.

Nos referiremos primeramente a *Liolaemus anomalus* Koslowsky, basada en ejemplares colectados en las altas cordilleras de Catamarca y cuyos tipos tuve oportunidad de ver en el Museo de La Plata gracias a la especial cortesía del Dr. Pablo Gaggero. El nombre que utilizó Koslowsky hace referencia a los caracteres cefálicos de esta especie en la que hace resaltar la extraña conformación de la cabeza determinada por la cortedad notable de la maxila superior. Igualmente, la disposición de las escamas, el aspecto general de las relaciones de sus miembros y cola revelan que esta especie no pertenece al género *Liolaemus*. Además pude observar la presencia de dientes laterales tricuspídeos y palatinos, caracteres muy infrecuentes en *Liolaemus*. La especie aparece muy relacionada tanto morfológicamente como ecológicamente con *Ctenoblepharys nigriceps* y *Ctenoblepharys schmidti* de Chile. La concordancia morfológica de *Liolaemus anomalus* con estos iguánidos, como igualmente su distribución altoandina permiten considerarlo como un miembro del género *Ctenoblepharys*, para lo cual propongo la siguiente nueva combinación *Ctenoblepharys anomalus* (Koslowsky).

La segunda especie corresponde a *Liolaemus lentus* Gallardo, descrita muy recientemente de Cochico, La Pampa. El animal representado fotográficamente, como su descripción y el contrastante fenómeno conductual de la lentitud, no son característicos del género *Liolaemus*. Mi impresión fue que se trataba de una especie del género *Phrynosaura*. Por ello la revisión de literatura me mostró la identidad de sus caracteres con la especie *Phrynosaura weneri* Müller, descrita sin distribución geográfica y atribuida supuestamente a "Chile o Argentina" por Burt y Burt. En carta personal al Dr. Hellmich le expresé mi sospecha que *Liolaemus lentus* fuese idéntico con *Phrynosaura weneri*. Posteriormente me confirmó la existencia del tipo de *weneri* y su comparación realizada por el Dr. Richard Etheridge confirmó la identidad del tipo de *weneri* con *lentus*.

Debemos concluir entonces que *Phrynosaura weneri* es una especie propia de los desiertos argentinos y *Liolaemus lentus* es solamente un sinónimo de esta especie.

Abstract

Taxonomic changes in two argentinian lizards are suggested. *Liolaemus anomalus* is included under the following new combination: *Ctenoblepharys anomalus* (Koslowsky).

Liolaemus lentus Gallardo is a synonymous of *Phrynosaura weneri* Müller.

Literatura

- DONOSO-BARROS, R. (1966): "Reptiles de Chile". Ediciones de la Universidad de Chile, 458 pp. I-CXLVI. F. Bruckmann K. G., Munchen, Alemania.
- GALLARDO, J. M. (1966): "*Liolaemus lentus* nov. sp. (Iguanidae) de La Pampa y algunas observaciones sobre saurios de dicha provincia argentina y del oeste de Buenos Aires". *Neotropica*, 12 (37) : 15-29.
- KOLOWSKY, J. (1895): "Batracios y Reptiles de La Rioja y Catamarca". *Revista Musea de La Plata*, 6 : 333-344. Pl. 1-4.
- MÜLLER, L. (1928): "Herpetologische Mitteilungen". *Zool. Anz.* 77 : 61-84.