

*NOTA DISTRIBUCIONAL SOBRE  
PLEURODEMA BUFONINA BELL.*

Dr. Roberto Donoso-Barros  
Instituto Central de Biología

En un reciente viaje efectuado a las proximidades del Volcán Antuco, el profesor Mario Ricardi, colectó bajo piedras varios anuros. Dos ejemplares correspondían a formas infantiles de *Bufo arunco*, otro par de animales fue fácilmente identificado por sus inmensas glándulas lumbares como *Pleurodema bufonina*.

Los ejemplares, muy activos, frente a la estimulación, asumían posiciones **pseudoaposemáticas**, caracterizadas por el ocultamiento de la cabeza con solevantamiento de la región posterior del tronco en que emergen las prominentes glándulas lumbares, otorgándole una apariencia terrífica.

La distribución geográfica de este animal en Chile ha sido referida a regiones de la patagonia chilena tales como los territorios de Aysén y Magallanes.

En la vertiente oriental de los Andes, la distribución de este anuro es más boreal, alcanzando hasta las proximidades de Mendoza. La comprobación de su presencia en las regiones montañosas próximas al Volcán Antuco amplían su distribución chilena hacia el norte de la conocida anteriormente.

*Summary*

The presence of *Pleurodema bufonina* in the vicinity of Volcán Antuco is referred as the more northern Chilean distribution of this frog.



*Pleurodema bufonina* Bell ejemplar coleccionado en las faldas del Volcán Antuco.



*Pleurodema bufonina* actitud aposemática