

NUEVOS REGISTROS Y LOCALIDADES PARA ALGUNAS ESPECIES DE LA AVIFAUNA CHILENA

New records and localities for the Chilean avifauna.

Héctor Oyarzo R.\* y  
Tomás Cekalovic K.\*\*

RESUMEN

Se comunican nuevos registros para las siguientes aves chilenas: *Muscisaxicola alpina cinerea*; *Muscisaxicola flavinucha brevirostris*; *Leptasthenura aegithaloides pallida*; *Diuca diuca crassirostris*; *Erolia bairdii*; *Catoptrophorus semipalmatus inornatus* y *Larus pipixcan*. Igualmente se aportan nuevas localidades para *Sterna paradisaea*; *Phalaropus fulicarius*; *Charadrius collaris*; *Tachyeres patachonicus* y *Scelorchilus albicollis albicollis*. Los ejemplares se encuentran depositados en el Museo de Zoología de la Universidad de Concepción (M.Z.U.C.), Chile.

ABSTRACT

New records from the following species of Chilean birds: *Muscisaxicola alpina cinerea*; *Muscisaxicola flavinucha brevirostris*; *Leptasthenura aegithaloides pallida*; *Diuca diuca crassirostris*; *Erolia bairdii*; *Catoptrophorus semipalmatus inornatus* y *Larus pipixcan*, are reported here, and the following new localities: *Sterna paradisaea*; *Phalaropus fulicarius*; *Charadrius collaris*; *Tachyeres patachonicus* and *Scelorchilus albicollis albicollis* are added. The specimens are

deposited in the Zoological Museum, University of Concepción (M.Z.U.C.), Chile.

Keywords: Aves. Geographical distribution. Chile. Neotropical region.

MATERIAL EXAMINADO

PASSERIFORMES  
TYRANNIDAE:

*Muscisaxicola alpina cinerea* Philippi y Landbeck, 1864. "Dormilona" "cenicienta". Ejemplar Nº 15230, Prov. Ñuble; Las Trancas (36º 54'S; 71º40'W), Marzo 2, 1981, H. Oyarzo col. La distribución anterior comprendía hasta Talca (sin indicar localidad precisa) (Philippi, 1965).

*Muscisaxicola flavinucha brevirostris* Olog, 1948. "Dormilona fraile de la Patagonia". Ejemplar Nº 15154, Cordillera de Chillán (Refugio Alemán: 36º53'S; 71º40'W), Marzo 1979, L. Biró col.; ejemplar Nº 15156, Cordillera de Chillán (Aguas Calientes: 36º54'S; 71º40'W), Marzo, 1979, G. Sanhueza col. Su distribución geográfica hacia el norte alcanzaba hasta Puerto Ibáñez (46º20'S; 71º55'W), (Philippi, 1965). La presente subespecie se encontraría como visitante de invierno en el área de captura.

FURNARIIDAE:

*Leptasthenura aegithaloides pallida* Dabenne, 1920. "Tijeral argentino". Ejemplar Nº 15141, Cordillera de Chillán (Las Trancas), Febrero 16, 1978, G. Moreno col. Anteriormente había sido capturado en Lonquimay (38º30'S; 71º20'W, 1840 m); Liucura (38º38'S;

\*Depto. Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Casilla 2407, U. de Concepción.

\*\*Conservador de Museo, Depto. Zoología, Fac. de Cienc. Biol. y de Rec. Nat., Casilla 2407, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

71918'W, 1160 m); Lago Icalma (38948'S; 71918'W, 1143 m) y Ñirehuau (45911'S; 72900'W) y Aysén Oriental (45925'S; 72935'W), (Philippi, 1965).

#### FRINGILLIDAE:

*Diuca diuca crassirostris* Hellmayr, 1934. "Diuca de pico grueso". Ejemplar N° 15232, Río Illapel (31935'S; 71906'W), Febrero 17, 1980, P. Collins y H. Oyarzo col. Su distribución alcanzaba hasta el Norte de Coquimbo (29957'S; 71922'W) (Philippi, 1965). El ejemplar examinado muestra la barba externa de las rectrices laterales blanca.

#### CHARADRIIFORMES

##### SCOLOPACIDAE:

*Catoptrophorus semipalmatus inornatus* (Brewster, 1887). "Playero de alas blancas". Ejemplar N° 1547, Prov. Linares: Chanco (35942'S; 72933'W), Febrero 15, 1951, R. Barros col. Su distribución más al Sur era Valparaíso (33902'S; 71938'W), (Philippi, 1965). Con la revisión del ejemplar señalado la especie llega hasta los 35° Latitud Sur.

*Erolia bairdii* (Coues, 1861). "Playero de Bird". Ejemplar N° 15234, Isla Mocha (Costa N. E.: 38920'S; 72935'W), Noviembre 10, 1978, H. Oyarzo col. Aparentemente 2° registro insular para la especie en Chile.

#### LARIDAE:

*Larus pipixcan* Wagler, 1831. "Gaviota de Franklin". Ejemplar N° 15235, Pucatrihue (40928'S; 73947'W), Noviembre 1, 1980, H. Oyarzo col. Su distribución por el Sur alcanzaba hasta Arauco (37915'S; 72919'W), (Philippi, 1965).

*Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763. "Gaviotín del Artico". Ejemplar N° 15160, Coronel, Caleta Los Rojos 37901'S; 73910'W), Diciembre 25, 1979, H. Oyarzo col.; ejemplar N° 15161, Estero de Lengua (36946'S; 73911'W), Octubre 4, 1979, G. Sanhueza y H. Oyarzo col.

#### PHALAROPODIDAE:

*Phalaropus fulicarius* (Linné, 1758). "Pollito de mar rojizo". Ejemplar N° 15055, Estero Lengua (36946'S; 73956'W), Noviembre 16, 1978, G. Sanhueza y H.

Oyarzo col.; ejemplar N° 15084, Río Bío-Bío: Santa Juana (37911'S; 72959'W), Noviembre 16, 1979, H. Oyarzo col.

#### CHARADRIIDAE:

*Charadrius collaris* Viellot, 1818. "Chorlito de collar". Ejemplar N° 15064, Cordillera de Chillán: Las Trancas (Río Diguillin), Septiembre 14, 1979, H. Oyarzo y V. Ruiz col. El ejemplar recolectado muestra plumaje de apareamiento y los ovarios se encontraron activos, por lo que es de presumir anide en la zona.

#### ANSERIFORMES

##### ANATIDAE:

*Tachyeres patagonicus* (King, 1830). "Pato quetru volador". Ejemplar N° 15229, Altos del Bío-Bío (38943'S; 71908'W), Febrero, 1980, M. C. Russel col. La única cita de localidad cordillerana al N. de los 40° latitud Sur se limitaba a las Termas de Chillán (Philippi, 1965). Fue capturado al estado de polluelo y vivía en domesticidad (M. C. Russel, com. pers.), por lo que seguramente la especie anida en la zona.

#### PASSERIIFORMES

##### RHYNOCRIPTIDAE

*Scelorchilus albicollis albicollis* (Kittlitz, 1830). "Tapáculo común". Ejemplar N° 15233, Fray Jorge (30940'S; 71940'W), Noviembre 21, 1978, H. Oyarzo col. Su distribución por el Norte alcanzaba hasta Los Vilos (31955'S; 71932'W), (Philippi, 1965).

#### BIBLIOGRAFIA

- Dabenne, R., 1920. Descripción de una nueva forma de *Leptasthenura aegithaloides* Kittlitz. El Hornero 2(2): 135.
- Philippi, R. A., 1964. Catálogo de las aves de Chile con su distribución geográfica. Inv. Zool. Chilenas 11: 3-179.
- Riso-Patrón, L., 1924. Diccionario Geográfico de Chile. Imprenta Universitaria. Santiago. 11-958.